



Enteroscopia de doble balón

Es un estudio reservado para pacientes con enfermedades en intestino medio. Se puede realizar a través de la boca (enteroscopia anterógrada) o del ano (enteroscopia retrógrada). Comparte características similares a la endoscopia y colonoscopia convencionales pero con mayor avance para explorar sitios más lejanos del intestino delgado.

Toma entre 60 y 120 minutos para alcanzar el máximo avance y permite tomar biopsias del intestino, reseca pólipos, aplicar coagulación, etc. Este procedimiento se realiza bajo sedación y algunas ocasiones bajo anestesia general.

Preparación previa:

*Si el estudio se realiza a través de la boca:

Requiere consentimiento informado y 6-8 horas de ayuno. Si usted toma cotidianamente medicamentos antihipertensivos, antiarrítmicos o anticonvulsivantes se recomienda ingerirlos con poca agua por la mañana del día de su estudio.



*Si el estudio es a través del ano:

Requiere consentimiento informado y 6-8 horas de ayuno. Si usted toma cotidianamente medicamentos antihipertensivos, antiarrítmicos ó anticonvulsivantes se recomienda ingerirlos con poca agua por la mañana del día de su estudio

Un día antes de su estudio: desayuno normal SIN fibra. Posteriormente sólo líquidos (jugo, té, gelatina) hasta la medianoche (nada color rojo). La preparación del colon inicia a las 14:00 hrs. del día previo al procedimiento y puede ser de una de las tres formas:

1) Fleet fosfosoda: Tomar el contenido de un frasco a las 14:00 horas y repetir a las 16:00 y 18:00 horas (3 frascos en total). Nota: se recomienda ingerir la mayor cantidad de líquidos claros posibles durante la preparación.

2) Nulytely: Disolver 1 sobre en 1 litro de agua y beber 250 ml cada 15 minutos. Repetir hasta completar 4 sobres (4 litros).

Nota: la solución es más fácil de beber si se deja enfriar antes de su administración.

3) Picoprep: Disolver 1 sobre en 1 vaso con agua y tomar a las 16:00 horas y repetir a las 18:00 horas (dos sobres).